

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "M.S.CURIE"
CLINICA DE PEDIATRIE

Bucuresti, Bd. C. Brancoveanu, 20, sector 4
Tel: 021-460.30.26, 021-460.15.90, fax: 021-337.39.41, 021-461.08.30
e-mail: pediatrie@mscopy.ro

SCRISOARE MEDICALA

Stimata colega/ Stimate coleg,

Pacientul ANDREESCU STEFAN, nascut pe data 16.02.2013, cu domiciliul in BUCURESTI, CNP: 5130216[REDACTED], a fost internat in sectia Pediatrie III in perioada 01-13.05.2013, FO: 14103, cu diagnostichele:

1. ATREZIE DE CAI BILIARE EXTRAHEPATICE OPERATA
2. FALIMENTUL CRESTERII
3. BRGE
4. ANGIOCOLITA ACUTA
5. ITU CU PSEUDOMONAS AERUGINOSA
6. HEPATITA NEONATALA CU HIPOPLAZIE DUCTULARA SI FIBROZA HEPATICA

Istoricul bolii: Sugar in varsta de 2 luni si 2 saptamani, operat la varsta de 2 luni pentru atrezie de cai biliare extrahepatice- anastomoza hepato-enterica pe ansa exclusa "a la Roux", cu evolutie postoperatorie complicata cu insuficienta hepatocelulara severa, se interneaza pentru varsaturi.

Clinic la internare: stare generala mediocra, afebril, icter intens sclerotegumentar, echilibrat hemodinamic si respirator, abdomen marit de volum prin hepatomegalie, cicatrice postoperatorie la nivelul hipocondrului drept, ficat cu marginea anterioara la ~ 4 cm sub rebord, consistenta crescuta, neregulara, splina nepalpabila, reflexe arhaice prezente, FA normotensiva.

Paraclinic: se anexeaza

Ecografie abdominala (01.05.2013): ficat cu dimensiuni normale, aspect heterogen difuz al lobului stang hepatic, doua arii nodulare difuz delimitate, una la nivelul segmentului II de ~ 13 mm si alta la nivelul segmentului IV, adiacent hilului, diametru ~12 mm, hiperecogene, hipovasculare- necesita corelare cu protocolul operator si examenele anterioare. Aerobilie difuza la nivelul LSH. Fara dilatatie de CBIH. VP in hil 6 mm (normal), viteza si flux normal. Pancreas, regiune regiune epigastrica, retroperitoneu median inexplorabile. IN rest eco abd in limite normale.

Tratament pe parcursul internarii: alimentatie cu Alfare, PEV, Aminoplasma, Ampicilina, Cefotaxim, Vit K, Plasma proaspata, Arnetine, Protectis

Se externeaza cu recomandari:

1. Alimentatie cu Alfare/ Heparon

2. LIV-52 2 ML DE 2 ORI ZI
3. urso-falk 1cp/250 mg/5 pac 1 pac seara 1 luna
4. protectis 5 pic zi 1 luna
5. vit B 2 ml zi 1 luna
6. arnetine 2 ml=50 mg plus 8 ml ser din care se dau 1 ml de 2 ori zi 1 luna
7. chimioprofilaxia ITU cu ceclor 5 ml=125 mg; 2,5 ml seara 1 luna
8. badijonaj bucal cu glicerina cu nistatin 7-10 zile
9. Profilaxia rahitismului
10. Protectis 5 picaturi/zi
11. Infant formula 0,5 ml/zi
12. Va fi ferit de factori de risc microbiologic si de microclimat
13. Dispensarizare prin medicul de familie

~~SECRET~~
Medic Primar Pediatrie
Dr. STANCIU CORINA